

# 1型糖尿病患者における、カーボカウントに加えて脂質・タンパク質摂取にも対応できる新規追加インスリン投与法の開発(2016年度、2017年度)


研究代表者 川村 智行（大阪市立大学大学院発達小児医学教室 講師）

## 研究のゴール 1型糖尿病の治療法開発

**研究の特徴** ブタを用いた動物実験と SAP やフリースタイルリブレを使った患者さんの実体験の両方をもちいた実践的な研究です。

## 研究概要

カーボカウントは、食生活の自由度を高めました。しかし日常生活で容易に使える脂質・タンパク質への追加インスリン投与法は確立していません。本研究の目的は、『1型糖尿病患者における、カーボカウントに加えて脂質・タンパク質摂取にも対応できる新規追加インスリン投与法の開発』です。



上図：ステーキだけを食べたときの血糖上昇(CGM)  
患者さんに、追加インスリン無しでステーキだけ食べていただいた時のCGMです。食後3-4時間後にゆっくり上昇しました。5時間目に補正のインスリンを打つと下がっています。

## これまでの研究結果・成果

患者さんに血糖変動を見ていたい研究を中心に行つてきました。油だけの摂取では血糖上昇を認めない、タンパク質による血糖上昇は3-5時間後から血糖上昇がある。肉や魚の種類によっては同じタンパク質量でも血糖上昇が異なることが分かりました。このように単純に、タンパク質や油の量だけではインスリン量は決められないようです。食事内容を工夫して研究を進めて参ります。

詳しいタンパク質による血糖上昇の生体反応については、ブタを用いた研究が必要であると考えて準備を進めています。

## 現在の状況

ブタの消化管機能や内分泌機能はヒトに非常に似ていることが分かっています。この研究ではマイクロミニブタを用いて、全身麻酔下で血管カテーテルを挿入し、薬剤を用いて膵 $\beta$ 細胞を破壊することで、1型糖尿病と同じ状態にしようと準備しております。現在は、この時点ですこし停滞中です。そして一旦1型糖尿病になったことが確認できたブタに、インスリン療法で血糖管理をする必要があります。

そのシステムが確立した段階で、様々な食品に対する生体反応への最適なインスリン投与法を開発するという手順での研究を計画しております。

## この研究で患者の生活や他の研究にどのような波及効果があるか(期待されるか)

カーボカウントだけでは十分管理できないことがある、高タンパク高脂質の食事に対するインスリン療法を確立することで、現在よりも更に自由な食生活と良好な血糖管理を両立することが出来ます。

## 患者・家族、寄付者へのメッセージ

できるだけ簡単な方法で計算し応用できる高タンパク高脂質の食事に対するインスリンの調整方法の開発を目指しております。

## ロードマップ

現在の進捗率 // 約40%

